

Syndrome des buveurs de lait - Définition

Avril 2015

- [Définition](#)

Définition

Le syndrome de Burnett, communément appelé syndrome des buveurs de lait, est une affection caractérisée par une insuffisance rénale, une alcalose et un excès de calcium dans le sang (hypercalcémie). Il touche les personnes qui boivent beaucoup de lait ou qui prennent des antiacides pour traiter l'acidité gastrique. Le sujet est victime de troubles digestifs (nausées, vomissements), de vertiges, de maux de tête et de douleurs musculaires (myalgies). La prise en charge repose sur la diminution de la consommation de lait ou des médicaments mis en cause.

Réalisé en collaboration avec des professionnels de la santé et de la médecine, sous la direction du [Docteur Pierrick HORDÉ](#)

Ce document intitulé « [Syndrome des buveurs de lait - Définition](#) » issu de **Sante-Medecine** (sante-medecine.commentcamarche.net) est soumis au droit d'auteur. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite. Sante-Medecine.net adhère aux principes de la charte « **Health On the Net** » (HONcode) destinée aux sites Web médicaux et de santé. [Vérifiez ici](#).